

**FARMACEUTICO**

**INSTRUÇÕES**

Este Caderno de Questões contém 30 (trinta) questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de Questões, solicite providências ao fiscal de sala.

Você receberá o Cartão Resposta, no qual serão transcritas as respostas do Caderno de Questões, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento contidas nele.

Após o preenchimento do Cartão Resposta com as respostas do Caderno de Questões, o candidato **deverá assinar o mesmo**.

**Durante a realização das provas é vedado:**

- a) consultar livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações ou equipamentos eletrônicos;
- b) a comunicação entre os candidatos;
- c) ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal;
- d) a ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada em embalagem plástica transparente sem rótulos e/ou etiquetas;
- e) entregar a prova e o cartão resposta antes de decorrida 45 (quarenta e cinco) minutos do seu início.
- f) o uso de relógio de qualquer tipo e aparelhos telefônicos, qualquer equipamento elétrico ou eletrônico, bonés, chapéus e porte de qualquer tipo de arma.

A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala auxiliar na interpretação.

A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será permitida depois de transcorrido 45 minutos do início da mesma.

Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, implicará na eliminação do candidato do Concurso Público.

O tempo de duração total da prova é de duas(02) horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão Resposta.

**Os 3 últimos candidatos ao terminarem a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente com os fiscais de sala assinar a folha ata, o verso dos cartões respostas, o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta.**

# Português

Analise a tirinha e responda as questões 01 e 02:



Copyright ©1999 Mauricio de Sousa Produções Ltda. Todos os direitos reservados.

6542

Fonte: Internet.

01-Em relação à tirinha:

I-A formiga e o urubu observam a fartura de comida de Magali na esperança de se alimentar das sobras.

II- No entanto, a fala da formiga revela um pressuposto que ela tem da personagem, que é o fato de ser comilona.

III-A fala da formiga está estruturada num período composto por subordinação.

IV-O termo que estabelece a relação existente entre as orações é a conjunção *que*.

- a) Somente I, II e III estão corretas.
- b) Somente I, III e IV estão corretas.
- c) Somente I, II e IV estão corretas.
- d) As quatro proposições estão corretas.
- e) Somente I e II estão corretas.

02-A formiga poderia ter substituído o verbo *sobrar* por:

- a) emular
- b) computar
- c) cominar
- d) deslindar
- e) sobejar

03-“Segundo o que combinamos, eu retorno em fevereiro.” Os termos em destaque estabelecem ideia de:

- a) comparação
- b) conformidade
- c) consequência
- d) causalidade
- e) finalidade

04) Dadas as frases:

1-Colabore para manter uma cidade e um país mais organizado.

- 2-Colabore para manter um país e uma cidade mais organizada.  
3-Colabore para manter uma cidade e um país mais organizados.

Em relação à concordância nominal:

- a) Somente 3 está correta.
- b) Somente 1 e 3 estão corretas.
- c) Somente 1 está correta.
- d) Somente 2 e 3 estão corretas.
- e) Todas estão corretas

05) A frase que está adequada à norma culta padrão é:

- a) É preferível andar de bicicleta a que abastecer a moto.
- b) É preferível andar de bicicleta ante a abastecer a moto.
- c) É preferível andar de bicicleta a abastecer a moto.
- d) É preferível andar de bicicleta do que abastecer a moto.
- e) É preferível andar de bicicleta de que abastecer a moto.

## Matemática

06) Um professor do ensino médio coloca a seguinte matriz quadrada no quadro:

$$\begin{bmatrix} 3x & 7 \\ 6 & 2 \end{bmatrix} = 18. \text{ Qual o valor que } x \text{ deve assumir para a determinante seja verdadeira?}$$

- (a) 3.
- (b) 6.
- (c) 8.
- (d) 10.
- (e) 12.

07) Leonardo tem a opção de fazer uma aplicação de R\$ 20.000,00. Que seria aplicar num fundo que rende 1,1% ao mês na modalidade de juro simples. Qual o montante que ele deve receber se optar por uma aplicação de 3 meses

- (a) R\$ 20.660,00
- (b) R\$ 20.220,00
- (c) R\$ 21.320,00
- (d) R\$ 20.734,12
- (e) R\$ 20.743,12

08) Um terreno retangular tem um perímetro de 100m, sabe-se, no entanto, que a medida do comprimento é o quádruplo da medida da largura. Com bases nessas informações esse terreno apresenta uma área de:

- (a) 320m<sup>2</sup>.
- (b) 360m<sup>2</sup>.
- (c) 400m<sup>2</sup>.
- (d) 420m<sup>2</sup>.
- (e) 160m<sup>2</sup>.

08) Uma indústria de peças metálicas onde sua produção da primeira hora do dia até a oitava hora aumenta de modo a obedecer a uma progressão aritmética. Desta forma a primeira hora produz 20 peças metálicas e no final da oitava hora produz 76 peças e produzindo nessas oito horas um total de 384 peças. De quanto é a razão  $r$  que representa o aumento de produção de peças neste caso?

- (a) 12.
- (b) 18.
- (c) 8.
- (d) 23.
- (e) 10.

10) Na construção de um muro de 42 metros de comprimento 4 pedreiros trabalhando 6 horas diárias levaram 12 dias para finalizá-lo. Se esse mesmo muro tivesse sido feito por 6 pedreiros com uma jornada de 8 horas diárias quantos dias teria sido executado?

- (a) 10 dias.    (b) 8 dias.    (c) 9 dias.    (d) 7 dias.    (e) 6 dias.

## Conhecimentos Específicos

11. Sobre os medicamentos anti-hipertensivo, assinale a alternativa correta:

- I) Metildopa é um agente anti-hipertensivo de ação central. Trata-se de um pró-fármaco, que exerce sua ação anti-hipertensiva através de um metabólito ativo. Atualmente, é usada principalmente no tratamento da hipertensão durante a gravidez, em virtude de sua segurança nesta condição.
- II) Os pacientes caucasianos jovens e de meia-idade têm maior probabilidade de responder a inibidores da ECA (enzima conversora da angiotensina); os afro-americanos idosos, como grupo, são mais resistentes ao efeito hipotensor desses fármacos.
- III) Ao contrário dos inibidores da ECA, os antagonistas dos receptores de angiotensina II não causam tosse, e a incidência de angioedema com o seu uso é bem menor do que aquela observada com os inibidores da ECA.
- a) Somente I está correta.  
b) Somente II está correta.  
c) Somente III está correta.  
d) Somente II e III estão corretas.  
e) I, II e III estão corretas.

12. Marque V para verdadeiro e F para falso em relação aos bloqueadores neuromusculares e em seguida assinale a alternativa correta.

- ( ) Bloqueadores neuromuscular não competitivos ou despolarizantes têm estrutura semelhante à acetilcolina, ligam-se aos receptores colinérgicos nicotínicos e os ativam.
- ( ) Dentre os bloqueadores neuromusculares não despolarizantes, suxametônio é o único agente em uso clínico.
- ( ) Bloqueadores neuromusculares não despolarizantes são agonistas competitivos dos receptores colinérgicos nicotínicos e atuam impedindo a despolarização.
- ( ) Tubocurarina, pancurônio e vecurônio são exemplos de bloqueadores neuromusculares não despolarizantes.
- ( ) Além de causar relaxamento muscular, os bloqueadores neuromusculares periféricos têm propriedades analgésicas e amnésicas.
- a) V, F, F, V, F.  
b) V, V, F, F, V.  
c) F, F, F, V, F.  
d) F, V, F, V, F.  
e) V, F, V, F, V.

13. Sobre os fármacos que atuam como antagonistas dos receptores beta-adrenérgicos, é correto afirmar:

- I) Betabloqueadores de primeira geração , não seletivos, como o propranolol são utilizados, entre outras indicações, para tratamento de angina de peito, hipertensão, arritmias cardíacas e profilaxia da enxaqueca.
- II) Atenolol é um antagonista  $\beta_1$ -seletivo, desprovido de atividade simpaticomimética intrínseca e de atividade estabilizadora da membrana. É lipofílico, tendo boa penetração no Sistema Nervoso Central.
- III) Tartarato de metoprolol e succinato de metoprolol apresentam diferenças farmacocinéticas, não sendo possível a intercambialidade entre eles. As diferenças farmacocinéticas vão resultar em esquemas posológicos diferentes para succinato e tartarato de metoprolol, ou seja, são empregadas doses e intervalos entre as doses diferentes entre eles.

- a) Somente I está correta.
- b) Somente II está correta.
- c) Somente III está correta.
- d) Somente I e II estão corretas.
- e) Somente I e III estão corretas.

14. Sobre os fármacos utilizados no tratamento da hipertensão, é incorreto afirmar:

- a) Ginecomastia e diminuição da libido são efeitos adversos raros relacionados a espironolactona, diurético poupador de potássio.
- b) Vasodilatadores diretos, como hidralazina, podem causar hipotensão postural, palpitações e cefaleia.
- c) Diuréticos tiazídicos, como hidroclorotiazida e clortalidona, podem acentuar hiperuricemia e espoliam potássio.
- d) Tosse é um efeito adverso comum associado aos bloqueadores de receptores de angiotensina 2, como captopril.
- e) A associação entre diuréticos tiazídicos e/ou de alça com fármacos digitálicos predis põem à intoxicação por hipopotassemia.

15. Assinale a alternativa correta sobre os fármacos utilizados no tratamento de epilepsia:

- a) A fenitoína tem taxa de eliminação não-linear, ou seja, sua taxa de eliminação varia em função da sua concentração. Em consequência, sua concentração plasmática aumenta desproporcionalmente à medida que a dose é elevada.
- b) A sedação é o efeito adverso mais frequente do fenobarbital, evidencia-se em certo grau em todos os pacientes no início do tratamento, mas sobrevém tolerância durante o uso crônico.
- c) A intoxicação aguda por carbamazepina pode acarretar estupor ou coma, hiperirritabilidade, convulsões e depressão respiratória.
- d) A oxcarbazepina é um cetoanálogo da carbamazepina. É um pró-fármaco, sendo convertido quase imediatamente em seu metabólito ativo.
- e) Todas as alternativas estão corretas.

16. Sobre os fármacos benzodiazepínicos, assinale a alternativa incorreta afirmar:

- a) Benzodiazepínicos mais lipofílicos, como diazepam, têm rápido início de efeito, mas, a duração de seu efeito é mais curta.
- b) A administração de benzodiazepínicos com alimentos tende a diminuir a velocidade de absorção.
- c) Benzodiazepínicos são eliminados no leite materno e efeitos adversos podem ser observados no lactente.

- d) Efeitos adversos paradoxais, tais como agressividade e raiva, são comuns com benzodiazepínicos e não estão relacionados com a dose administrada.
- e) Apesar dos efeitos adversos, os benzodiazepínicos são relativamente seguros. Mesmo em altas doses raramente são fatais, a menos que outros fármacos sejam tomados concomitantemente.

17. Sobre os fármacos antipsicóticos, marque V para verdadeiro e F para falso e em seguida assinale a alternativa correta.

- ( ) Antipsicóticos típicos ou convencionais são conhecidos como neurolépticos, devido ao alto risco de efeitos adversos extrapiramidais secundários ao antagonismo de receptores dopaminérgicos D<sub>2</sub>.
  - ( ) Antipsicóticos podem diminuir o limiar convulsivante, facilitando a ocorrência de convulsões em pacientes epiléticos. Pode ser necessário aumentar a dose do anticonvulsivante.
  - ( ) Antipsicóticos podem causar reação distônica aguda, acatisia, parkinsonismo e síndrome neuroléptica maligna, que não melhoram com a administração de antiparkinsonianos.
  - ( ) Discinesia tardia acentua-se com a suspensão do antipsicótico e uso de antiparkinsonianos.
  - ( ) Antipsicóticos estão associados a efeitos adversos anticolinérgicos, tais como sialorreia, diarreia, bradicardia e incontinência urinária.
- a) V, V, V, V, V.
  - b) V, F, V, F, V.
  - c) F, F, F, V, V.
  - d) V, V, F, V, F.
  - e) F, F, V, V, F.

18. Em relação aos medicamentos antidepressivos, é correto afirmar:

- I) Período de latência de duas a três semanas é comum a todos os antidepressivos, não se devendo modificar doses antes de transcorrido esse tempo.
  - II) É preciso estimular a adesão dos pacientes durante a latência, pois, além de não ter ocorrido efeito desejado, ainda podem aparecer manifestações adversas precoces.
  - III) Os antidepressivos potencializam os efeitos depressores do Sistema Nervoso Central do álcool.
- a) Somente I está correta.
  - b) Somente II está correta.
  - c) Somente III está correta.
  - d) Somente I e II estão corretas.
  - e) I, II e III estão corretas.

19. Sobre o fármaco lítio, utilizado como estabilizante de humor, é incorreto afirmar:

- a) Lítio é um metal alcalino cujas características físico-químicas são semelhantes às de sódio, potássio, cálcio e magnésio.
- b) Bloqueio da função dopaminérgica e facilitação de função serotoninérgica têm sido relacionados aos efeitos antimaniacos e antidepressivos do lítio, respectivamente.

- c) Lítio tem índice terapêutico baixo. Mesmo com doses adequadas, alguns efeitos adversos (náusea e fadiga) podem ocorrer no início do tratamento.
- d) A associação entre lítio e diuréticos deve ser evitada, pois a excreção de lítio é aumentada, dificultando a manutenção do nível terapêutico.
- e) Os efeitos tóxicos crônicos incluem déficit da função renal, alterações da tireoide, manifestações cutâneas, leucocitose e ganho de peso.

20. Sobre os fármacos utilizados no tratamento da Doença de Alzheimer, assinale a alternativa correta:

- I) A donepezila é um inibidor seletivo da acetilcolinesterase no Sistema Nervoso Central, com poucos efeitos na acetilcolinesterase dos tecidos periféricos. Tem meia-vida longa, possibilitando a administração de uma única dose diária.
  - II) A memantina, utilizada na Doença de Alzheimer moderada a grave, atua como agonista de receptores glutamatérgicos N-metil-D-aspartato (NMDA).
  - III) Os efeitos adversos mais comuns da rivastigmina incluem tontura, cefaleia, náusea, vômitos, diarreia, anorexia, fadiga, insônia, confusão e dor abdominal.
- a) Somente I está correta.
  - b) Somente II está correta
  - c) Somente III está correta
  - d) Somente I e III estão corretas.
  - e) I, II e III estão corretas.

21. Sobre os fármacos utilizados no tratamento de dislipidemias, assinale a alternativa correta:

- a) As estatinas são os agentes mais efetivos e mais bem tolerados para o tratamento da dislipidemia. Atuam como agonistas da 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A (HMG-CoA) redutase, que catalisa a biossíntese do colesterol .
- b) A sinvastatina é um pró-fármaco, que é modificada no fígado na forma ativa de lactona. Seus efeitos máximos sobre os níveis plasmáticos de colesterol são alcançados em 7 a 10 dias.
- c) O risco de miopatia e rabdomiólise associado às estatinas não está relacionado com as concentrações plasmáticas destas.
- d) Os fibratos são indicados no tratamento de hipertrigliceridemia, objetivando a prevenção de pancreatite aguda.
- e) A ezetimiba reduz os níveis de colesterol por inibir a absorção de colesterol pelos enterócitos no intestino delgado, não devendo ser associada às estatinas..

22. Sobre os fármacos que atuam no sistema gastrointestinal, assinale a alternativa incorreta:

- a) Os supressores mais potentes da secreção de ácido gástrico são os inibidores da  $H^+$ ,  $K^+$  - ATPase gástrica (bomba de prótons), tais como, omeprazol, esomeprazol e pantoprazol.
- b) Os inibidores da bomba de prótons são pró-fármacos que exigem ativação em ambiente ácido.
- c) Os antiácidos a base de hidróxido de magnésio e de alumínio são considerados eficazes e seguros, sendo amplamente empregados. Podem ser administrados concomitantemente com outros fármacos, pois não afetam a absorção.

- d) Os inibidores da bomba de prótons, em doses adequadas, podem reduzir a produção diária de ácido gástrico (basal e estimulada) em 80 a 95%.
- e) Os antagonistas dos receptores H<sub>2</sub>, tais como cimetidina e ranitidina, inibem a produção de ácido gástrico ao competir reversivelmente com a histamina pela sua ligação aos receptores H<sub>2</sub> na membrana basolateral das células parietais.

23. Sobre os fármacos que afetam a função gastrointestinal, é correto afirmar:

- I) Os principais efeitos colaterais da metoclopramida são reações extrapiramidais, sendo mais comuns em crianças e adultos jovens, e com doses mais altas.
  - II) A metoclopramida pode causar galactorréia devido ao bloqueio do efeito inibitório da dopamina na secreção de prolactina.
  - III) A domperidona, por não atravessar facilmente a barreira hematoencefálica, é desprovida de efeitos extrapiramidais.
- a) Somente I está correta.
  - b) Somente II está correta.
  - c) Somente III está correta.
  - d) Somente I e II estão corretas.
  - e) I, II e III estão corretas.

24. Sobre os fármacos antimicrobianos, assinale a alternativa correta:

- a) Cloranfenicol possui amplo espectro de atividade antimicrobiana. Tem efeitos adversos raros, mas graves, incluindo supressão medular não relacionada à dose.
- b) Quinolonas, como clindamicina e vancomicina, têm sua absorção diminuída por antiácidos, devido à quelação destas.
- c) A concentração de eritromicina base microbiologicamente ativa no soro é semelhante para as várias preparações disponíveis do fármaco (estolato, estearato, etinilssuccinato).
- d) Aminoglicosídeos, como a doxiciclina, podem causar alterações dentárias como hipoplasia de esmalte e coloração dos dentes, sendo por isso contraindicados em gestantes e crianças até 8 anos.
- e) Ceftriaxona, cefalosporina de segunda geração, está disponível na forma parenteral (intramuscular e intravenosa) para tratamento de meningites bacterianas.

25. Sobre os fármacos utilizados no tratamento da asma, é correto afirmar:

- I) Salmeterol é um agonista dos receptores betaadrenérgicos de ação longa com alta seletividade pelo subtipo  $\beta_2$ .
  - II) Agonistas dos receptores  $\beta_2$ -adrenérgicos de ação curta, como a terbutalina, são usados no tratamento inalatório do broncoespasmo agudo.
  - III) Os glicocorticoides inalatórios são utilizados profilaticamente para controlar a asma, em vez da sua administração aguda para reverter os sintomas asmáticos.
- a) Somente I está correta.
  - b) Somente II está correta.
  - c) Somente III está correta.
  - d) Somente I e II estão corretas.
  - e) I, II e III estão corretas.



26. De acordo com a Portaria 344 de 12 de maio de 1998, que aprova o Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial, e suas atualizações, marque V para verdadeiro e F para falso e depois assinale a alternativa correta.

( ) As vendas de medicamentos a base da substância Misoprostol constante da lista "C3" (outras substâncias sujeitas a controle especial) são restritas a estabelecimentos hospitalares devidamente cadastrados e credenciados junto a Autoridade Sanitária competente.

( ) A dispensação por farmácias e drogarias de medicamentos de uso sistêmico a base de substâncias constantes da lista "C2" (retinóicas), somente poderá ser realizada mediante o credenciamento prévio efetuado pela Autoridade Sanitária Estadual.

( ) É proibida a manipulação em farmácias das substâncias constantes da lista "C2" (retinóicas), na preparação de medicamentos de uso sistêmico e tópico, e de medicamentos a base das substâncias constantes da lista "C3" (imunossupressoras) deste Regulamento Técnico e de suas atualizações.

( ) É vedado o transporte de medicamentos a base de substâncias, constantes das listas deste Regulamento Técnico e de suas atualizações, por pessoa física, quando de sua chegada ou saída no país, em viagem internacional, sem a devida cópia da prescrição médica.

( ) As prescrições por cirurgiões dentistas e médicos veterinários só poderão ser feitas quando para uso odontológico e veterinário, respectivamente.

a) F, V, F, V, V.

b) F, V, F, V, F.

c) V, F, V, F, V.

d) F, V, V, V, V.

e) V, V, F, V, V.

27. De acordo com a Portaria 344 de 12 de maio de 1998, que aprova o Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial, e suas atualizações, é correto afirmar:

I) A Notificação de Receita Especial para dispensação de medicamentos de uso sistêmico que contenham substâncias constantes da lista "C3" (retinóicas) deste Regulamento Técnico e de suas atualizações, deverá estar acompanhada de "Termo de Consentimento Pós-Informação" (ANEXO XV e ANEXO XVI), fornecido pelos profissionais aos pacientes alertando-os que o medicamento é pessoal e intransferível, e das suas reações e restrições de uso.

II) A quantidade prescrita de cada substância constante da lista "C1" (outras substâncias sujeitas a controle especial) e "C5" (anabolizantes), deste Regulamento Técnico e de suas atualizações, ou medicamentos que as contenham, ficará limitada a 5 (cinco) ampolas e para as demais formas farmacêuticas, a quantidade para o tratamento correspondente a no máximo 60 (sessenta) dias. No caso de prescrição de substâncias ou medicamentos antiparkinsonianos e anticonvulsivantes, a quantidade ficará limitada até 6 (seis) meses de tratamento.

III) O formulário da Receita de Controle Especial (ANEXO XVII), válido em todo o Território Nacional, deverá ser preenchido em 2 (duas) vias, manuscrito, datilografado ou informatizado, apresentando, obrigatoriamente,

em destaque em cada uma das vias os dizeres: "1ª via - Retenção da Farmácia ou Drogaria" e "2ª via - Orientação ao Paciente".

- a) Somente I e II estão corretas.
  - b) Somente II e III estão corretas.
  - c) Somente I e III estão corretas.
  - d) I, II e III estão corretas.
  - e) Somente III está correta.
28. De acordo com a RDC 20, de 5 de maio de 2011, que dispõe sobre o controle de medicamentos à base de substâncias classificadas como antimicrobianos, de uso sob prescrição, isoladas ou em associação, assinale a alternativa incorreta:
- a) A prescrição de medicamentos antimicrobianos deverá ser realizada em receituário privativo do prescritor ou do estabelecimento de saúde, não havendo, portanto modelo de receita específico.
  - b) Não há limitação do número de itens contendo medicamentos antimicrobianos prescritos por receita.
  - c) Os estabelecimentos deverão manter à disposição das autoridades sanitárias, por um período de 5 (cinco) anos a documentação referente à compra, venda, transferência, perda e devolução das substâncias antimicrobianas bem como dos medicamentos que as contenham.
  - d) As bulas e os rótulos das embalagens dos medicamentos contendo substâncias antimicrobianas da lista constante do Anexo I desta Resolução devem conter, em caixa alta, a frase: "VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA - SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA".
  - e) No ato da dispensação devem ser registrados nas duas vias da receita os seguintes dados: I - a data da dispensação; II - a quantidade aviada do antimicrobiano; III - o número do lote do medicamento dispensado; e IV - a rubrica do farmacêutico, atestando o atendimento, no verso da receita.
29. De acordo com o Código de Ética Farmacêutica, aprovado pela resolução nº 596 de 21 de fevereiro de 2014, é correto afirmar:
- I) O farmacêutico responde individual ou solidariamente, ainda que por omissão, pelos atos que praticar, autorizar ou delegar no exercício da profissão.
  - II) O farmacêutico deve exercer a profissão com honra e dignidade, devendo dispor de condições de trabalho e receber justa remuneração por seu desempenho.
  - III) É direito do farmacêutico decidir, justificadamente, sobre o aviamento ou não de qualquer prescrição, bem como fornecer as informações solicitadas pelo usuário.
- a) Somente I está correta.
  - b) Somente II está correta.
  - c) Somente I e III estão corretas.
  - d) Somente I e II estão corretas.
  - e) I, II e III estão corretas.
30. De acordo com a Lei Nº 13.021 de 8 de agosto de 2014, que dispõe sobre o exercício e a fiscalização das atividades farmacêuticas, é incorreto afirmar:

- a) Obriga-se o farmacêutico, no exercício de suas atividades, a organizar e manter cadastro atualizado com dados técnico-científicos das drogas, fármacos e medicamentos disponíveis na farmácia;
- b) Ocorrendo a baixa do profissional farmacêutico, obrigam-se os estabelecimentos à contratação de novo farmacêutico, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, atendido o disposto nas Leis nos 5.991, de 17 de dezembro de 1973, e 6.437, de 20 de agosto de 1977.
- c) É responsabilidade do poder público assegurar a assistência farmacêutica, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, de universalidade, equidade e integralidade.
- d) O farmacêutico e o proprietário dos estabelecimentos farmacêuticos agirão sempre solidariamente, realizando todos os esforços para promover o uso racional de medicamentos.
- e) É responsabilidade do estabelecimento farmacêutico fornecer condições adequadas ao perfeito desenvolvimento das atividades profissionais do farmacêutico.